

Actinica® Lotion

Zdravotnícka pomôcka slúžiaca ako prevencia rôznych form rakoviny kože u rizikových pacientov (imunosuprimovaných).

Vlastnosti


V rámci dvojročného výskumu zameraného na imunosuprimovaných pacientov (s orgánovými transplantami), ktorí sú vysoko náchylní na tvorbu nemelanomovej rakoviny kože (aktinická keratóza, bazocelulárny karcinóm a spinocelulárny karcinóm) preukázala Actinica Lotion schopnosť účinnej prevencie aktinickej keratózy a spinocelulárneho karcinómu.

Actinica Lotion chráni pred slnečným žiareniom typu UVB aj UVA. Obsahuje fotostabilné a širokospektrálne filtre a je odolný voči vode. Actinica Lotion má tiež hydratačné vlastnosti, ktoré pomáhajú zlepšiť stav kože. Lipozomálne lôcio nie je parfumované a neobsahuje bežné PEG emulgátory, čo zaisťuje dobrú snášenosť a možnosť aplikovania aj na veľmi citlivú kožu.

Používanie a dávkovanie:

Počas celého roka nanášajte Actinica Lotion každé ráno pred pobytom na slnku, rovnomerne a v dostatočnom množstve na kožu, ktorá bude vystavená UV žiareniu a nebude chránená odvodom. Ani prípravky s vysokým ochranným faktorom neposkytujú absolutnú ochranu pred UV žiareniom. Actinica Lotion nanášajte pred aplikáciou iného kosmetického produktu (nechajte Actinica Lotion niekoľko minút dobre vstriebat). Po dlhom kontakte s vodou alebo pri silnom potení natieranie opakujte. Noste ochranný oděv a vyhýbate sa priamemu slnečnému žiareniu.

Plocha kože jednotlivých častí tela sa liší. Nasledovná tabuľka udáva približné dávkovacie množstvá (stláčenia dávkovača). Nanášanie zniženého množstva redukuje ochranný účinok.



Pre optimálne rozostenie a príjemný pocit na koži sa doporuča rozotrieť prvú dávku na tvári a po 5-10 min. rozotrieť dávku druhú. Uistite sa, že medzi prvým a druhým nanášaním neuplynie doba dlhšia ako 10-15 min. Dávkovacie údaje pre tvár, temeno atď. možno použiť ako príklad na stanovenie potrebného dávkowania pre ostatné časti tela.
Na začiatku je potrebné dávkovač viackrát stlačiť, aby došlo k nasatiu lôcia a preto prvé stláčenia neobsahujú plné dávky. Dávkovač treba držať kolmo a pomaly stlačať, aby sa dostavili plné dávky.

Obmedzenia

Výskyt nežiaducich reakcií na niektorú zo zložiek lipozomálneho lôcia Actinica Lotion nie je možné vylúčiť. Ak dojde po krátkom pôsobení slnečných lúčov k podráždeniu pleti, výskytu kožnej vyrážky alebo reakcií pripomínajúcej spáleninu od slnka, ide zrejmé o nežiaduci vedľajší účinok a je nutné použiť iný ochranný prostriedok.
Vyuvarujte sa aplikáciu v oblasti očí a ako ochranu použite kvalitné slnečné okuliare. Ak pride Actinica Lotion do priameho kontaktu s očami, môže spôsobiť pálenie. V prípade, že sa vám prípravok dostane do očí, vypláchnite ich dostatočným množstvom vody!

Použitie v kombinácii s repellentmi

V prípade, že sa Actinica Lotion používa súčasne s ochrannými prostriedkami pred hmyzem, treba ako prvý nanášať Actinica Lotion; ochrana pred slnkom sa môže oslabiť.

Zvláštne upozornenia

Pripravky chrániace pred slnkom môžu v kombinácii s vonkajšími faktormi viesť k trvalým zmenám farby niektorých materiálov ako napríklad textilií, syntetických materiálov a ďal. Z tohto dôvodu je vhodné obliecť sa až potom, ako bol prípravok Actinica Lotion celkom absorbovaný do pokožky.

Zloženie: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazole, Isoamyl p-Methoxycinnamate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Methylene bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Propylparaben, Methylparaben, Excipients

Veľkosť balenia
Actinica Lotion 80 g SPF 50+ **UVA**

CE Zdravotnícka pomôcka triedy I

Výrobca:
Spirig Pharma AG, Froschackerstrasse 6, CH-4622 Egerkingen
Švajčiarsko

Kontakt v SR:
Galderma-Spirig
Česká a Slovenská republika a.s.
Nobelova 28
SK-831 02 Bratislava
Tel: +421 2 4910 90 11

Dátum poslednej revízie textu: 21.05.2014

Actinica® Lotion

Zdravotnícky prostriedok slúžiaci ako prevence rôznych form rakoviny kôže u rizikových pacientov (imunosuprimovaných).

Vlastnosti



V rámci dvojročného výskumu zamieraného na imunosuprimovaných pacientov (po orgánových transplantacích), ktorí sú vysoko náchylní ke vzniku nemelanomovej rakoviny kôže (aktinická keratóza, bazocelulárny karcinóm a spinocelulárny karcinóm) preukázala Actinica Lotion schopnosť účinnej prevencie aktinickej keratózy a spinocelulárneho karcinómu.

Actinica Lotion chráni pred slnečným žiareniom typu UVB i UVA. Obsahuje fotostabilné a širokospektrálne filtre a je odolný vůči vode. Actinica Lotion má tiež hydratačné vlastnosti, ktoré pomáhajú zlepšiť stav kôže. Lipozomálne lôcio nie je parfumované a neobsahuje bežné PEG emulgátory, čo zaisťuje dobrú snášenosť a možnosť aplikovania aj na veľmi citlivú kôžu.

Používanie a dávkovanie:

V prubežu celého roka nanášajte Actinica Lotion každé ráno pred pobytom na slnku, rovnomerne a v dostatočnom množstve na kožu, ktorá bude vystavená UV žiareniu a nebude chránená odvodom. Ani prípravky s vysokým ochranným faktorom neposkytujú absolutnú ochranu pred UV žiareniom. Actinica Lotion nanášajte pred aplikáciou iného kosmetického produktu (nechajte Actinica Lotion niekoľko minút dobre vstriebat). Po dlom kontakte s vodou alebo pri silnom potení natieranie opakujte. Noste ochranný oděv a vyhýbate sa priamemu slnečnému žiareniu.

Plocha kože jednotlivých častí tela sa liší. Nasledovná tabuľka udáva približné dávkovacie množstvá (stláčenia dávkovača). Nanášanie zniženého množstva redukuje ochranný účinok.



Pre optimálne rozostenie a príjemný pocit na koži se doporučuje roztriet prvú dávku na tvári a po 5-10 min. roztriet dávku druhou. Uistite se, že mezi prvním a druhým nanášením neuplynie doba delší než 10-15 min. Dávkovacie údaje pro tvár, temeno atd. lze použít jako příklad pro stanovení potřebného dávkování pro ostatní části těla.

Na začátku je nutné dávkovač vícekrát stlačit, aby došlo k nasatí lôcia, a proto prvé stláčení neobsahuje plné dávky. Dávkovač treba držet kolmo a pomalu stlačovat, aby se dostavily plné dávky.

Omezení

Výskyt nežiaducich reakcií na niektorú zo zložiek lipozomálneho lôcia Actinica Lotion nie je možné vylúčiť. Jestliže dojde po krátkém pôsobení slnečných lúčov k podráždeniu pleti, výskytu kožnej vyrážky alebo reakcií pripomínajúcej spáleninu od slnka, ide zrejmé o nežiaduci vedľajší účinok a je nutné použiť iný ochranný prostriedok.
Vyuvarujte se aplikacií v oblasti očí a jako ochranu použijte kvalitné slnečné okuliare. Ak pride Actinica Lotion do priameho kontaktu s očami, môže spôsobiť pálenie. V prípade, že sa vám prípravok dostane do očí, vypláchnite ich dostatočným množstvom vody!

Použití v kombinaci s repellenty

V prípade, že se Actinica Lotion používá současně s ochrannými prostředky chránícími před hmyzem, je třeba nanášet jako první Actinica Lotion; ochrana před sluncem se může oslabit.

Zvláštne upozornenia

Pripravky, které chrání před sluncem mohou v kombinaci s vnitřními faktory vést k trvalým změnám barvy některých materiálů, jako například textilií, syntetických materiálů atd. Z tohoto důvodu je vhodné obléct se až potom, co byl přípravek Actinica Lotion celza absorbován do pokožky.

Zloženie: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazole, Isoamyl p-Methoxycinnamate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Methylene bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Propylparaben, Methylparaben, Excipients

Velikost balení
Actinica Lotion 80 g SPF 50+

CE Zdravotnický prostředek třídy I

Výrobce:
Spirig Pharma AG, Froschackerstrasse 6, CH-4622 Egerkingen
Švýcarsko

Kontakt v ČR:
Galderma-Spirig
Česká a Slovenská republika a.s.
Nobelova 28
SK-831 02 Bratislava
Tel: +421 2 4910 90 11
www.galderma.cz

Datum poslední revize textu: 21.05.2014

Οδηγίες χρήσης

GR

Actinica® Lotion

Ιδιότητες

Σε μια μελέτη διάρκειας 2 ετών σε ανοσοκατεσταμένους ασθενείς (μεταμφορέμένους ασθενείς) με υψηλό κινδύνο ανάπτυξης μη-μελανωματικών καρκίνων του δέρματος, το Actinica Lotion αποδειχθήκε αποτελεσματικό στην πρόληψη των ακτινικών κερατοσφενδυτών και του καρκινώματος από πλακώδες επιθήλιο.

To Actinica Lotion προστατεύει από τη UVB & UVA ακτινοβολία καθώς περιέχει φωτοσταθερά φιλτρά ειρηνές φάσματος και είναι ανθεκτικό στο νέρο.

To Actinica Lotion ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα. Η αποσία αρώματος και προπολεογύκυκολών (PEG), εξασφαλίζει την καλή ανοχή του γαλακτώματος ακόμη και από υπερευαίσθητα δέρματα.

Οδηγίες χρήσης και προτεινόμενη δοσολογία

Απορργεύτε την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Να φοράτε ρούχα που θα σας προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία. Κάθε πρωι, εφαρμόστε το Actinica Lotion σε όλες τις περιοχές που θα εκτεθούν στον ήλιο και απλώστε το ομοιόμορφα, πριν από την έκθεση σας στον ήλιο. Εφαρμόστε το Actinica Lotion πριν τη χρήση κάποιου άλλου καλλυντικού προϊόντος σας (αφήστε το Actinica Lotion για λίγα λεπτά ώστε να απορροφηθεί από την επιδερμίδα). Ανανεύνετε την εφαρμογή του προϊόντος μετά από παρατεταμένη παραμονή στο νέρο ή λόγω της έντονης εφιδρώσης.

Η επιδερμίδα διαφέρει από άτομο σε άτομο. Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε τη δοσολογία κατά προσέγγιση (=πίεση δοσομετρητή) για τις διάφορες περιοχές του σώματος σας:



Για να εξασφαλίσετε καλύτερη κατανομή και ευχάριστη αίσθηση στο δέρμα, μπορείτε να εφαρμόσετε την προτεινόμενη δόση σε 2 εφαρμογές, π.χ. αρχικά μία πίεση του δοσομετρητή και μία δεύτερη πίεση 5-10 λεπτά αργότερα.

Φροντίστε ώστε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εφαρμογής να μην υπάρχει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 10-15 λεπτών.

Η δοσολογία που αναφέρεται παραπάνω για το πρόσωπο, το τριχωτό της κεφαλής κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σημείο αναφοράς για τη δοσολογία που χρειάζονται και τα υπόλοιπα σημεία του σώματος.

Αρχικά, χρειάζεται να πιέσετε αρκετές φορές το δοσομετρητή, για να μπορέσετε να τρέξει το γαλακτώμα. Τις πρώτες φορές οι πρώτες πιέσεις δεν αποτελούν επαρκείς δόσεις. Πατήστε αργά για να λάβετε τη σωστή δοσολογία.

Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, προτείνεται να φορούν ρούχα που θα τους προστατεύουν, ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Περιορισμοί κατά τη χρήση

Δεν μπορεί να αποκλειθεί η εμφάνιση ανεπιθύμητης ενέργειας σε κάποιο από τα συστατικά του Actinica Lotion. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, δερματικό εξάνθημα ή αντίδραση παρόμοια με ηλιακό έγκαυμα, μετά από σύντομη έκθεση στον ήλιο, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να διακοπεί.

Να αποφεύγετε την απευθείας επαφή με τα μάτια και να φοράτε γυαλιά ήλιου που σας προσφέρουν προστασία από την UV ακτινοβολία. To Actinica Lotion σε περίπτωση επαφής του με τα μάτια, μπορεί να προκαλέσει αισθημα καύσου. Στην περίπτωση αυτή, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Χρήση σε συνδυασμό με εντομοσπωθητικά

Εάν το Actinica Lotion χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εντομοσπωθητικό, συνιστάται η χρήση πρώτα του Actinica Lotion. Περιμένετε περίπου 15 λεπτά πριν την εφαρμογή του εντομοσπωθητικού. Να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών προϊόντων μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του Actinica Lotion.

Ειδικές πληροφορίες

Τα αντηλιακά φιλτρά UV στο Actinica Lotion μπορεί να προκαλέσουν χρωματικές αλλοιώσεις στα ρούχα, τα συνθετικά υλικά και σε άλλα υλικά. Για αυτό αποφύγετε την χρήση του Actinica Lotion αμέσως πριν ντυθείτε.

Σύνθεση: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazole, Isoamyl p-Methoxycinnamate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Methylene bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Propylparaben, Methylparaben, Excipients

Συσκευασία

Actinica Lotion: 80g SPF 50+

CE

Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class I



Παρασκευάζεται στην Ελβετία από την:
Spirig Pharma AG, Froschackerstrasse 6,
4622 Egerkingen / Switzerland

Διανομέα: Galderma ΕΛΛΑΣ ΑΕ,
Ειωθόφορος Πεντέλης 31, 15235, Βριλήσσια,

Τηλ.: 210 8104190